

Mårfamilien: Brud

Latinsk navn: *Mustela nivalis*

Engelsk navn: Weasel

Klasse: Pattedyr

Orden: Rovdyr

Familie: Mårfamilien

Bruden findes i størstedelen af Danmark, men den mangler på nogle øer, bl.a. Bornholm.

Kendetegn

Bruden er Danmarks mindste rovdyr. Den kendes på sin rødbrune overside og lyse underside. Bruden har en lang, tynd krop med korte ben. Hovedet er næsten trekantet og snuden spids. Bruden kan forveksles med lækatten, som dog er lidt større og har en længere hale.

Føde

Bruden er et rovdyr, som især spiser mus og småfugle. Men den tager også fuglææg, frøer samt insekter og smådyr.



Brud - Weasel - *Mustela nivalis*

© Kirsten Hjørnø



Fakta

- Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
- Længde: 17-22 cm
- Vægt: 40-140 g
- Kuld størrelse: 4-6
- Antal kuld: 2
- Drægtighed: 5 uger



Vidste du det?

Bruden opholder sig en stor del af tiden i underjordiske gange, som den ikke selv har gravet. Den finder gamle gange fra muldvarpe, rotter eller mus, som den hviler sig i. Hunnen føder sine unger i underjordiske gange.

Mårfamilien: Grævling

Latinsk navn: Meles meles

Engelsk navn: Badger

Klasse: Pattedyr

Orden: Rovdyr

Familie: Mårfamilien

Grævlinger findes i det meste af Danmark, bortset fra på nogle mindre øer. Grævlinger lever sammen i grupper eller klaner, som kan tælle over 30 dyr, men normalt er der 5-10 dyr i en klan. De forsvare deres område mod andre grævlinger og markerer det med duftmærker og ekskrementer.

Kendetegn

Grævlinger kendes især på deres kileformede hvide hovede med en sort stribe på langs, de små øjne og korte ører. Grævlingen har fem tæer på hver fod med meget kraftige gravekløer, som den bruger, når den graver huler.

Føde

Grævlinger lever både af planteføde og smådyr. De spiser bl.a. små pattedyr og fugle, men de tager også insekter, frøer, bær og frugter.



© Kirsten Hjarne



Fakta

- Levesteder: Skoven, Det åbne land
- Længde: 80-110 cm
- Vægt (han): 9-17 kg
- Kuldstørrelse: 2-3
- Antal kuld: 1
- Drægtighed: 8 uger



Vidste du det?

Grævlinger lever sammen i klaner, som deler et stort gangsystem, der ofte er bygget ind i en skrænt. Gangsystemerne kan blive meget store, fordi grævlingerne bygger videre på tidligere grævlingegange.

Mårfamilien: Husmår

Latinsk navn: *Martes foina*
Engelsk navn: Beech marten
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Mårfamilien

Husmåren findes i hele Danmark bortset fra på Bornholm, Læsø og Anholt samt nogle mindre øer. Man skulle tro, at husmåren levede i huse, men den lever faktisk i småskove og i det åbne land. Husmåren indretter sit bo i et hullt træ eller i en forladt ræve- eller grævlingegrav.

Kendetegn

Husmåren kendes fra skovmåren på sin store hvide plet på halsen, der er gul hos skovmåren. Desuden er husmårens snude lys, mens skovmårens snude er sort.

Føde

Husmåren spiser især smånavere, småfugle og fugleæg, men hvis der mangler føde, spiser den også frøer og insekter samt døde dyr, fx trafikdræbte dyr. Om sommeren kan den også spise bær og frugter.



© Kirsten Hjørne

Fakta

- Levesteder: Skoven
- Længde: 45 cm
- Vægt(han): 1-2,3 kg
- Kuldstørrelse: 2-4
- Antal kuld: 1
- Drægtighed: 9 måneder



Vidste du det?

Husmåren forsvare sit eget territorium, og det gælder både hanner og hunner. En husmår tolererer ikke, at der kommer andre kønsmodne husmårer af samme køn ind på dens område. Hannens territorium kan dog række ind over flere hunners territorium.

Mårfamilien: Ilder

Latinsk navn: *Mustela putorius*
Engelsk navn: European polecat
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Mårfamilien

Ilderen findes i det meste af Danmark bortset fra nogle småøer samt Bornholm, Lolland, Falster og Møn. Ilderen lever, hvor der er tilstrækkeligt med byttedyr. Det betyder ikke så meget, om levestedet er skov, mark eller langs sø og vandløb.

Kendetegn

Ilderen kendes fra andre mårdyr på den sort/hvide ansigtsmaske. Ilderen er desuden meget mørkere på undersiden end på oversiden.

Føde

Ilderen spiser mange små gnavere, frøer og tudser. Men den tager også harekillinger, fugle, æg, fisk og krybdyr. Ilderen jager som regel om natten.



© Kirsten Hjørne



Fakta

- Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
- Længde: 30-45 cm
- Vægt (han): 0,7-1,5 kg
- Vægt (hun): 0,5-0,8 kg
- Kuld størrelse: 4-6
- Antal kuld: 1
- Drægtighed: 40 dage



Vidste du det?

Ilderen skaffer sig frisk mad om vinteren ved fx at samle forråd af frøer og tudser, som den bider rygmarven over på. Derved bliver dyrene lamme, og de kan holde sig friske indtil ilderen vil æde dem.

Mårfamilien: Lækat

Latinsk navn: *Mustela erminea*

Engelsk navn: Stoat (Ermine)

Klasse: Pattedyr

Orden: Rovdyr

Familie: Mårfamilien

Lækatten er et meget slankt lille mårdyr. Den er almindelig i Danmark, hvor den lever både i det åbne land og i skove. Lækatten findes ikke på Bornholm og på flere småøer. Lækatten kaldes også hermelin eller væsel.

Kendetegn

Lækatten kendes på sin lysebrune sommerpels og sin hvide vinterpels. Den er hvid på maven og har sort halespids året rundt. Lækatten kan forveksles med brud, men bruden er noget mindre og har ikke sort halespids.

Føde

Lækatten lever mest af mus. Den kan på grund af sin slanke krop kravle ned i musenes gange. Lækatter tager også større byttedyr, fx harekillinger og fasankyllinger, rotter og fugleæg.





Fakta

- Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
- Længde: 18-30 cm
- Vægt: 80-300 g
- Kuldstørrelse: 5-8
- Antal kuld: 1
- Drægtighed: 11 måneder



Vidste du det?

Lækatten er det eneste pattedyr i Danmark, der skifter fra sommerpels til hvid vinterpels. Vinterpelsen er lækattens måde at tilpasse sig et hvidt vinterlandskab, men med de seneste års mange milde vintre bliver der måske færre hvide lækatte.



Kirsten Høhne

Mårfamilien: Mink

Latinsk navn: *Mustela vison*
Engelsk navn: American mink
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Mårfamilien

Mink blev importeret til pelsfarme i Europa i 1920'erne og 30'erne. Det er undslupne mink fra minkfarme, som nu udgør de fritlevende bestande, og i dag er minken udbredt i hele Danmark.

Kendetegn

Minken har et kort, spidst hoved, korte ben og en lang, tynd krop. Pelsen er som regel mørkebrun med hvide felter på strube og hals. Minken har korte ben og svømmehud mellem de inderste led af tæerne. Minken forveksles ofte med odder og ilder.

Føde

Minkens føde består mest af fisk og fugle, små pattedyr, og krebs. Minken kan derfor være en trussel overfor vandfugle.



© Kirsten Hjørne



Fakta

- Levesteder: Sø og vandløb, Det åbne land
- Længde: 45-70 cm med hale
- Vægt: 700-1.500 gram
- Kuld størrelse: 4-6
- Antal kuld: 1
- Drægtighed: 6-12 uger
- Max levealder: 7-8 år



Vidste du det?

Minkene i den danske natur kan have mange forskellige farver og de kan være helt sorte eller helt hvide. Det skyldes, at de er undsluppet fra fangenskab, hvor man har avlet mink med specielle farver.

Mårfamilien: Odder

Latinsk navn: Lutra lutra
Engelsk navn: Eurasian otter
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Mårfamilien

Odderen er helt tilpasset livet i vand. Dens strømlinede krop og glatte pels, som skyr vandet, betyder at den kan bevæge sig meget hurtigt under vand, når den søger føde.

Kendetegn

Odderens næsebor, øjne og ører sidder højt på hovedet, så den både kan ånde, se og høre, når den svømmer i vandoverfladen. Odderens ben er korte, og den har svømmehud mellem tæerne. Pelsen er helt mørkebrun, bortset fra et lysere parti på halsen og brystet.

Føde

Odderen lever især af fisk, men den spiser også frøer, småfugle og små pattedyr.



© Kirsten Hjørne



Fakta

- Levesteder: Sø og vandløb
- Længde: 95-140 cm med hale
- Kuld størrelse: 2-3
- Antal kuld: 1 hvert 2. år
- Drægtighed: 8 uger



Vidste du det?

Odderen har været tæt på at uddø i Danmark og Europa, men den blev fredet i 1967, og nu gøres der meget for at forbedre dens levevilkår, så bestanden fortsat kan vokse. Der bliver stadig flere oddere i Danmark, hvor bestanden er størst i det nordvestlige Jylland.

Mårfamilien: Skovmår

Latinsk navn: *Martes martes*
Engelsk navn: Forest marten
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Mårfamilien

Skovmår er udbredt over hele landet med undtagelse af Bornholm og nogle mindre øer. Arten er dog forholdsvis sjælden. Skovmåren lever i nåleskov, løvskov og blandingsskov, men kan godt forekomme i mere åbne habitattyper. Dyrene er overvejende nataktive og søger føde både på jorden og i træerne. Om sommeren og efteråret, når der er rigeligt med føde, gemmer skovmåren små forråd rundt omkring i terrænet.

Kendetegn

Skovmåren er et lille, elegant rovdyr, med små runde ører, chokolade-brun pels og en lang, busket hale. På halsen har skovmåren en bred, gullig halsplet. Skovmårens snude er sort og øjnene er sorte og nysgerrige.

Føde

Smånavere, egern, fugle og fugleæg er skovmårens foretrukne føde, men den tager også snegle, frøer og insekter. En stor del af efterårsføden består af bær.



Fakta

- Levesteder: Skove
- Længde: 60-75 cm med hale
- Kuld størrelse: 2-5
- Antal kuld: 1
- Drægtighed: 31 dage



Vidste du det?

At skovmåren er et af vores sjældneste pattedyr. At skovmåren er meget sky og lever dybt inde i skoven? At skovmåren er en lynhurtig kæger, der kan jage og fange egern i skovens træer

Mårfamilien: Skovmår

Latinsk navn: *Martes martes*
Engelsk navn: Forest marten
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Mårfamilien

Skovmår er udbredt over hele landet med undtagelse af Bornholm og nogle mindre øer. Arten er dog forholdsvis sjælden. Skovmåren lever i nåleskov, løvskov og blandingsskov, men kan godt forekomme i mere åbne habitattyper. Dyrene er overvejende nataktive og søger føde både på jorden og i træerne. Om sommeren og efteråret, når der er rigeligt med føde, gemmer skovmåren små forråd rundt omkring i terrænet.

Kendetegn

Skovmåren er et lille, elegant rovdyr, med små runde ører, chokolade-brun pels og en lang, busket hale. På halsen har skovmåren en bred, gullig halsplet. Skovmårens snude er sort og øjnene er sorte og nysgerrige.

Føde

Smånavere, egern, fugle og fugleæg er skovmårens foretrukne føde, men den tager også snegle, frøer og insekter. En stor del af efterårsføden består af bær.



Fakta

- Levesteder: Skove
- Længde: 60-75 cm med hale
- Kuld størrelse: 2-5
- Antal kuld: 1
- Drægtighed: 31 dage



Vidste du det?

At skovmåren er et af vores sjældneste pattedyr. At skovmåren er meget sky og lever dybt inde i skoven? At skovmåren er en lynhurtig kæger, der kan jage og fange egern i skovens træer